



HIPP COMBIOTIK®

Tilberedning



Følg tilberedning- og doseringsanvisningen nøye. Feilaktig tilberedning og oppbevaring av den ferdiglagede erstatningen kan medføre uønsket bakterievekst.

1. Kok opp vann til 100 °C og la koke i noen minutter. Avkjøl til 40-50 °C.
2. Hell antall strøkne måleskjeer som er tilpasset måltidet i en ren flaske.
3. Tilsett vann i flasken. Skru på lokket og rist flasken godt.
4. Avkjøl til spisetemperatur. Kontroller temperaturen ved å droppe litt erstatning på innsiden av håndledet.
5. Serveres straks og kast eventuelle rester etter måltidet.

Viktig

Tilbered alltid blandingen med friskt, kokt og avkjølt vann og bruk alltid rene sterile flasker. Tilbered kun ett måltid av gangen. Serveres straks og kast eventuelle rester etter måltid.

Doseringstabell

Mengde kokt vann	Antall strøkne måleskjeer	Mengde ferdig blanding
60 ml	2	70 ml
90 ml	3	100 ml
120 ml	4	135 ml
150 ml	5	170 ml
180 ml	6	200 ml
210 ml	7	235 ml

Morsmelk er den beste næringen for barnet ditt. Rådfør deg med helsesykepleier eller lege før du gir barnet ditt tilskuddsblanding.

Dosering

Det er viktig for barnets helse og velbehag at man verken bruker for mye eller for lite pulver i forhold til vannmengde. Anbefalt dosering og tilberedning bør følges nøye. Bruk alltid strøkne måleskjeer med pulver og bruk alltid den måleskjeen som følger med i forpakningen.

HiPP Forbrukerkontakt
NO tel. +46 8 799 1926
www.hipp.no

